



Antígeno prostático específico total y libre

Debe tomarse antes o después de una prostatectomía o biopsia prostática.

Debe esperar 10 días como mínimo para su examen:

- Es necesario que tenga abstinencia sexual de mínimo 24 horas.
- No tacto rectal.
- No masaje prostático.
- No montar a caballo.
- No montar bicicleta.

Clínica Nuestra Señora de los Remedios

Avenida 2 Norte # 24 - 157 / B. San Vicente

Lunes a viernes 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sábado 6:00 a.m. 12: 00 p.m.

Centro Médico María Gay Tibau

Cra. 42, # 1 - 38 / B. El Lido.

Lunes a viernes 7:00 a.m. – 4:00 p.m.



INDICACIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS

Por favor tener presente las siguientes recomendaciones para la realización de tus exámenes:

1. Presentarse al Laboratorio en ayunas en el horario establecido.
2. El ayuno ideal según la edad:
 - Bebé lactante: justo antes de la siguiente comida
 - Paciente pediátrico (entre 3-5 años): de 2 a 3 horas.
 - Niños jóvenes y adultos: de 6 años en adelante de 8 a 12 horas.
3. No tomar bebidas alcohólicas ni ingerir alimentos con alto contenido de grasa mínimo 24 horas antes de la toma de la muestra.
4. No fumar antes ni durante la realización de sus exámenes de Laboratorio.
5. Evitar hacer ejercicio el día de la realización de los exámenes.
6. Si ha recibido medio de contraste, realizar sus exámenes de laboratorio 2 días después.
7. Si tiene un diagnóstico de diabetes, infórmalo a la Bacteriólogo / auxiliar de laboratorio.
8. Es importante informar si está tomando algún tipo de medicamento
9. Evitar tomar suplemento que contenga biotina el día anterior.
10. Nuestros horarios de atención para toma de muestras: